## PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM

1) Wykonać badanie poziomu kreatyniny – tydzień przed badaniem
2) W przypadku badania jamy brzusznej pozostać na czczo 5 godzin.
3) Nie należy przerywać /zmieniać dotychczasowego leczenia farmakologicznego tzn. Przyjąć wszystkie swoje leki ja co dzień
4) Przed badaniem jamy brzusznej i miednicy należy w dniu poprzedzającym badania przyjąć lek zmniejszający nadmierne gromadzenie się gazów w przewodzie pokarmowym np. Espumisan, Ulgix wzdęcia:
    A) wieczorem ( 5 kapsułek)
    B) w dniu badania rano ( 3 kapsułki)
5) Badanie jamy brzusznej i miednicy wykonujemy z pełnym pęcherzem.
6) Przed badaniem gruczołu krokowego ( prostaty) należy w dniu poprzedzającym badanie przyjąć delikatne środki przeczyszczające lub wykonać płytką lewatywę.
7) Na badanie należy przynieść wyniki dotychczasowych badań badanej okolicy np: TK, MRI, USG, RTG oraz inną posiadaną dokumentację np: karta leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.
8) Na badanie należy zgłosić się w wygodnym ubraniu pozbawionym elementów metalowych,
9) W przypadku badania MRI głowy należy zrezygnować z soczewek kontaktowych oraz makijażu i lakieru do włosów ponieważ kosmetyki zawierają drobinki metali , które mogą zaburzać obraz i fałszować wyniki.

## PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA MR

**BEZWZGLĘDNE**

- Rozrusznik serca
- Podskórna pompa insulinowa
- Wszczepiony aparat słuchowy
- Nurostymulator
- Klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe
- Metaliczne ciało obce w oku

**WZGLĘDNE**

- Metalowe endoprotezy
- Pierwszy trymestr ciąży

**W badaniu MRI środki kontrastowe stosuje się w ograniczonym zakresie u kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Po ich podaniu należy się wstrzymać od karmienia piersią przez 24 godziny.**

**Termin badania …… godzina……miejsce…….**