Szpitale Pomorskie sp. z o.o. Podmiot Leczniczy Samorządu Województwa Pomorskiego	**PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ**

SKIEROWANIE DOSTARCZONO ……

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ TK Z KONTRASTEM

3.1. – Wykonać **badanie poziomu kreatyniny-tydzień przed badaniem.**

3.2. – W dniu badania

3.2.1. **5 godzin przed badaniem nie jeść i nie pić**

3.2.2. dostarczyć wszystkie ostatnie wyniki badań:
TK, PET-TK, rtg, MRI (CD i opis), USG,
badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopi i inne) oraz
wynik poziomu kreatyniny i eGFR

3.2.3. W przypadku posiadania dostępu stałego (port) dostarczyć w dniu badania paszport portu naczyniowego. Bez paszportu niemożliwe będzie podanie kontrastu do portu.

3.3. – Badanie z podaniem środka cieniującego wymaga zgody pacjenta na donaczyniowe podanie środka cieniującego

3.4. – W ciągu 24 godzin po badaniu wypić minimum 2 litry niegazowanej wody

3.5. – W przypadku cukrzycy leczonej Metforminą (gluformin, metformax):

* Pacjenci z eGFR>30ml/min/1,73m^2 otrzymujacy środki kontrastowe dożylnie należy kontynuować normalnie przyjmowanie metforminy.

** Pacjenci z eGFR<30ml/min/1,73m^2 otrzymujący środki kontrastowe dożylnie należy zaprzestać przyjmowania metforminy od momentu podania środka kontrastowego. Należy oznaczyć eGFR w ciągu 48 godzin, a jeśli czynność nerek nie ulegnie istotnej zmianie, wówczas można ponownie rozpocząć przyjmowanie metforminy.

3.6. – W przypadku nadczynności tarczycy – przynieść zaświadczenie od lekarza endokrynologa o możliwości przyjęcia kontrastu jodowego niejonowego.

3.7. - Prowadzenie pojazdów oraz obsługa urządzeń mechanicznych jest niewskazana przez 1 godz. po podaniu kontrastu dożylnie

PLANOWANY TERMIN:

DATA BADANIA …….. GODZ.PRZYJŚCIA ……
Budynek 26 pokój 026

Szpitale Pomorskie sp. z o.o. Podmiot Leczniczy Samorządu Województwa Pomorskiego	**PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ**

SKIEROWANIE DOSTARCZONO ……

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ TK JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY

4.1. – Wykonać **badanie poziomu kreatyniny-tydzień przed badaniem.**

4.2. – W dniu badania

4.2.1. **5 godzin przed badaniem nie jeść i nie pić**

4.2.2. dostarczyć wszystkie ostatnie wyniki badań:
TK, PET-TK, rtg, MRI (CD i opis), USG,
badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopi i inne) oraz
wynik poziomu kreatyniny i eGFR

4.2.3. przynieść ze sobą 1 litr niegazowanej wody

4.2.4. W przypadku posiadania dostępu naczyniowego (port) dostarczyć w dniu badania paszport portu naczyniowego. Bez paszportu niemożliwe będzie podanie kontrastu do portu.

4.3. – Badanie z podaniem środka cieniującego wymaga zgody pacjenta na donaczyniowe podanie środka cieniującego

4.4. – W ciągu 24 godzin po badaniu wypić minimum 2 litry niegazowanej wody

4.5. – W przypadku cukrzycy leczonej Metforminą (gluformin, metformax):

* Pacjenci z eGFR>30ml/min/1,73m^2 otrzymujacy środki kontrastowe dożylnie należy kontynuować normalnie przyjmowanie metforminy.

** Pacjenci z eGFR<30ml/min/1,73m^2 otrzymujący środki kontrastowe dożylnie należy zaprzestać przyjmowania metforminy od momentu podania środka kontrastowego. Należy oznaczyć eGFR w ciągu 48 godzin, a jeśli czynność nerek nie ulegnie istotnej zmianie, wówczas można ponownie rozpocząć przyjmowanie metforminy.

4.6. – W przypadku nadczynności tarczycy – przynieść zaświadczenie od lekarza endokrynologa o możliwości przyjęcia kontrastu jodowego niejonowego.

4.7. - Prowadzenie pojazdów oraz obsługa urządzeń mechanicznych jest niewskazana przez 1 godz. po podaniu kontrastu dożylnie

PLANOWANY TERMIN:

DATA BADANIA …….. GODZ.PRZYJŚCIA ……
Budynek 26 pokój 026